

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS POUR LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS

INFECTÉS PAR UNE BMR / BHRé **Précautions Complémentaires** **Type Contact (PCC)**

Contextes	Exemples	Tablier à UU	Surblouse* à UU	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes / Visière de protection	Gants à UU
Sans contact avec le résident	Distribution des repas / traitements	χ	χ	χ	χ	χ	χ
Avec contact mais sans risque d'exposition aux liquides biologiques	Prise des constantes, lever au fauteuil	✓	χ	χ	χ	✓*	χ
Avec contact et avec risque d'exposition aux liquides biologiques	Soins de nursing, prélèvement sanguin	✓	χ	χ	χ	✓*	✓

* Si Surblouse perméable, porter un tablier à UU par-dessus

*En cas d'exposition par projection ou aérosolisation à un produit biologique d'origine humaine

- ◆ Ces recommandations sont à appliquer en complément des **Précautions Standard**
- ◆ **Hygiène des mains à réaliser selon les 5 indications** des recommandations des Précautions Standard (cf. annexe)
- ◆ Les EPI devront être **retirés avant de sortir de la chambre**

Le résident colonisé par une BMR/BHRé (= absence de signes d'infection) est autorisé à sortir de sa chambre, à prendre ses repas en salle à manger, à participer aux activités (hors atelier culinaire et balnéothérapie) après la réalisation d'un geste d'hygiène des mains



Période Covid-19 : Port du masque de soin PERMANENT



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS POUR LA PRISE EN CHARGE DE RÉSIDENTS

infectés par CLOSTRIDIUM difficile

Précautions Complémentaires

Type Contact (PCC)

Contextes	Exemples	Tablier à UU	Surblouse* à UU	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes / Visière de protection	Gants à UU
Sans contact avec le résident	Distribution des repas / traitements	✗	✓	✗	✗	✗	✓
Avec contact mais sans risque d'exposition aux liquides biologiques	Prise des constantes, lever au fauteuil	✗	✓	✗	✗	✓*	✓
Avec contact et avec risque d'exposition aux liquides biologiques	Soins de nursing, prélèvement sanguin	✗	✓	✗	✗	✓*	✓

* Si Surblouse perméable, porter un tablier à UU par-dessus

*En cas d'exposition par projection ou aérosolisation à un produit biologique d'origine humaine

◆ Ces recommandations sont à appliquer en complément des **Précautions Standard**

◆ **Hygiène des mains à réaliser selon les 5 indications** des recommandations des Précautions Standard (cf. annexe)

◆ Les EPI devront être **retirés avant de sortir de la chambre**



Période Covid-19 : Port du masque de soin PERMANENT



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS POUR LA PRISE EN CHARGE DE RÉSIDENTS

SUSPECTS / CONFIRMÉS COVID-19

Précautions Complémentaires

Type Contact (PCC) / Gouttelettes (PCG)

Contextes	Exemples	Tablier à UU	Surblouse* à UU	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes / Visière de protection	Gants à UU
Sans contact avec le résident	Distribution des repas / traitements	✗	✗	✓	A porter uniquement si le patient est sous oxygénothérapie > 6L/min ou aérosolthérapie	✗	✗
Avec contact mais sans risque d'exposition aux liquides biologiques	Prise des constantes, lever au fauteuil	✓	✗	✓	A porter uniquement si le patient est sous oxygénothérapie > 6L/min ou aérosolthérapie	✓*	✗
Avec contact et avec risque d'exposition aux liquides biologiques	Soins de nursing, prélèvement sanguin	✓	✓** lors d'une procédure à risque d'aérosolisation	✓	A porter uniquement si le patient est sous oxygénothérapie > 6L/min ou aérosolthérapie OU réalisation d'acte à risque d'aérosolisation	✓*	✓

* Si Surblouse perméable, porter un tablier à UU par-dessus

*En cas d'exposition par projection ou aérosolisation à un produit biologique d'origine humaine

- ◆ Toutes ces recommandations sont à appliquer en complément des **Précautions Standard**
- ◆ **Hygiène des mains à réaliser selon les 5 indications** des recommandations des Précautions Standard (cf. annexe)
- ◆ Les EPI devront être retirés avant de sortir de la chambre **à l'exception du masque**



Période Covid 19 : Port du masque de soin PERMANENT



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS POUR LA PRISE EN CHARGE DE RÉSIDENTS

SUSPECTS / CONFIRMÉS GRIPPE / IRA

Précautions Complémentaires

Type Gouttelettes (PCG)

Contextes	Exemples	Tablier à UU	Surblouse* à UU	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes / Visière de protection	Gants à UU
Sans contact avec le résident	Distribution des repas / traitements	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Avec contact mais sans risque d'exposition aux liquides biologiques	Prise des constantes, lever au fauteuil	✓	✗	✓	✗	✓*	✗
Avec contact et avec risque d'exposition aux liquides biologiques	Soins de nursing, prélèvement sanguin	✓	✗	✓	✓*	✓*	✓

* Si Surblouse perméable, porter un tablier à UU par-dessus

*En cas d'exposition par projection ou aérosolisation à un produit biologique d'origine humaine

- ◆ Toutes ces recommandations sont à appliquer en complément des **Précautions Standard**
- ◆ **Hygiène des mains à réaliser selon les 5 indications** des recommandations des Précautions Standard (cf. annexe)
- ◆ Les EPI devront être retirés avant de sortir de la chambre **à l'exception du masque**



Période Covid 19 : Port du masque de soin PERMANENT



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS POUR LA PRISE EN CHARGE DE RÉSIDENTS

SUSPECTS / CONFIRMES : TUBERCULOSE (BK), ROUGEOLE, VARICELLE

Précautions Complémentaires

Type Air (PCA)

Contextes	Exemples	Tablier à UU	Surblouse* à UU	Masque chirurgical	Masque FFP2	Lunettes / Visière de protection	Gants à UU
Sans contact avec le résident	Distribution des repas / traitements	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Avec contact mais sans risque d'exposition aux liquides biologiques	Prise des constantes, lever au fauteuil	✗	✗	✗	✓	✓*	✗
Avec contact et avec risque d'exposition aux liquides biologiques	Soins de nursing, prélèvement sanguin	✓	✓** lors d'une procédure à risque d'aérosolisation	✗	✓	✓*	✓

* Si Surblouse perméable, porter un tablier à UU par-dessus

*En cas d'exposition par projection ou aérosolisation à un produit biologique d'origine humaine

- ◆ Toutes ces recommandations sont à appliquer en complément des **Précautions Standard**
- ◆ **Hygiène des mains à réaliser selon les 5 indications** des recommandations des Précautions Standard (cf. annexe)
- ◆ Les EPI devront être retirés avant de sortir de la chambre **à l'exception du masque**



Période Covid 19 : Port du masque de soin PERMANENT




LES RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE POUR LA PRISE EN CHARGE DE RÉSIDENTS INFECTÉS ET/OU COLONISÉS

Type de Précautions	Gestion des excréta*	Dispositifs Médicaux	Sols et Surfaces	Linge	Vaisselle	Déchets
PC Contact BMR / BHRé	DASRI si diarrhées	UU ou matériel dédié ou désinfection adaptée avec un détergent/désinfectant (d/D) normé par immersion ou désinfection de surface si dispositifs non immergeables	Bio nettoyage minutieux avec un d/D normé	Filière classique. Si linge souillé par des liquides biologiques en quantité importante, évacuation par la filière linge contaminé	Lave-vaisselle cycle long 60°C (si HS, nettoyage avec liquide vaisselle et eau chaude courante (pas de contact avec le reste de la vaisselle des autres résidents))	DAOM DASRI si souillé de liquides biologiques/excrétas
PC Contact Clostridium Difficile	DASRI lors d'ICD	UU ou matériel dédié ou désinfection adaptée avec un d/D normé (<u>sporicide</u>) par immersion ou désinfection de surface si dispositifs non immergeables	Bio nettoyage minutieux avec un d/D <u>sporicide</u> Utilisation de <u>consommables à UU</u>	Filière classique Si linge souillé par des liquides biologiques/excrétas, évacuation par la filière linge contaminé	Lave-vaisselle cycle long 60°C (si HS, nettoyage avec liquide vaisselle et eau chaude courante (pas de contact avec le reste de la vaisselle des autres résidents))	DAOM DASRI si souillé de liquides biologiques/excrétas
PC Contact Gale	DAOM	UU ou matériel dédié ou désinfection adaptée avec un d/D normé par immersion ou désinfection de surface si dispositifs non immergeables	Bio nettoyage minutieux avec un d/D normé	Filière linge contaminé. Lavage ≥ à 60 °C cycle long. Si linge fragile notamment : traitement avec antiparasitaire ou après « étouffement du linge » durant 24H avant le lavage en machine	Lave-vaisselle cycle long 60°C (si HS, nettoyage avec liquide vaisselle et eau chaude courante (pas de contact avec le reste de la vaisselle des autres résidents))	DAOM DASRI si souillé de liquides biologiques/excrétas
PC Contact et Gouttelettes Covid-19	DASRI	UU ou matériel dédié ou désinfection adaptée avec un d/D normé par immersion ou désinfection de surface si dispositifs non immergeables	Bio nettoyage minutieux avec un d/D normé	Filière classique	Lave-vaisselle cycle long 60°C (si HS, nettoyage avec liquide vaisselle et eau chaude courante (pas de contact avec le reste de la vaisselle des autres résidents))	DASRI
PC Gouttelettes Grippe / IRA	DAOM	UU ou matériel dédié ou désinfection adaptée avec un d/D normé par immersion ou désinfection de surface si dispositifs non immergeables	Bio nettoyage minutieux avec un d/D normé	Filière classique	Lave-vaisselle cycle long 60°C (si HS, nettoyage avec liquide vaisselle et eau chaude courante (pas de contact avec le reste de la vaisselle des autres résidents))	DAOM DASRI si souillé de liquides biologiques/excrétas
PC Air Tuberculose (BK), Rougeole	DAOM DASRI : si BK urinaire	UU ou matériel dédié ou désinfection adaptée avec un d/D normé (<u>mycobactéricide/ sporicide</u>) par immersion ou désinfection de surface si dispositifs non immergeables	Bio nettoyage minutieux avec un d/D normé	Filière classique	Lave-vaisselle cycle long 60°C (si HS, nettoyage avec liquide vaisselle et eau chaude courante (pas de contact avec le reste de la vaisselle des autres résidents))	DAOM DASRI si souillé de liquides biologiques et dans le cas de BK



ANNEXES

LES 5 INDICATIONS DES RECOMMANDATIONS DES PRÉCAUTIONS STANDARD SELON L'OMS



PRÉCAUTIONS STANDARD 2017

Champ d'application et stratégie de mise en œuvre

R1 Les précautions standard sont un ensemble de mesures visant à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignant, soigné et environnement, ou par exposition à un produit biologique d'origine humaine (sang, sécrétions, excréta...).

R2 Le respect des obligations et recommandations vaccinales, associé aux précautions standard, contribue à la prévention de la transmission croisée des micro-organismes.

R3 Les précautions standard constituent un socle de pratiques de base s'intégrant dans toute stratégie de prévention des infections associées aux soins et de maîtrise de la diffusion des bactéries résistantes aux antibiotiques. Elles contribuent à la sécurité des soins (soignant/soigné) lors de la prise en charge d'un patient.

R4 Mettre en œuvre les organisations et allouer les moyens nécessaires à la mise en place et l'observance des précautions standard.

R5 Les précautions standard sont à appliquer pour tout soin, en tout lieu, pour tout patient quel que soit son statut infectieux, et par tout professionnel de santé.

PRÉCAUTIONS STANDARD 2017

Hygiène des mains

R6 Lors des soins et en préalable à toute hygiène des mains :


- avoir les avant-bras dégagés,
- avoir les ongles courts, sans vernis, faux ongles ou résine,
- ne pas porter de bijou (bracelet, bague, alliance, montre).

R7 Effectuer une hygiène des mains :

1. avant un contact avec le patient,
2. avant un geste aseptique,
3. après un risque d'exposition à un produit biologique d'origine humaine,
4. après un contact avec le patient,
5. après un contact avec l'environnement du patient.

R8 La désinfection par friction avec un produit hydro-alcoolique est la technique de référence dans toutes les indications d'hygiène des mains en l'absence de souillure visible.

R9 En cas de mains visiblement souillées, procéder à un lavage simple des mains à l'eau et au savon doux.



PRÉCAUTIONS STANDARD 2017

Hygiène respiratoire

R19 Faire porter un masque à toute personne (patient, résident, visiteur, professionnel de santé, intervenant extérieur, aidant...) présentant des symptômes respiratoires de type toux ou expectoration.



R20 Utiliser un mouchoir à usage unique pour couvrir le nez et la bouche lors de toux, éternuement et le jeter immédiatement après usage. En l'absence de mouchoir, tousser ou éternuer au niveau du coude ou en haut de la manche plutôt que dans les mains.



R21 Réaliser une hygiène des mains après contact avec des sécrétions respiratoires ou des objets contaminés. Ne pas toucher les muqueuses (yeux, nez, bouche) avec des mains contaminées.



R22 Mettre en place une information sur les mesures d'hygiène respiratoire à prendre et mettre à disposition le matériel nécessaire (masques, mouchoirs jetables...) dans les lieux stratégiques.



PRÉCAUTIONS STANDARD 2017

Prévention des accidents avec exposition au sang


ou tout produit biologique d'origine humaine

R23 Pour les soins utilisant un objet perforant :

- porter des gants de soins,
- utiliser les dispositifs médicaux de sécurité mis à disposition,
- après usage :
 - ne pas recapuchonner,
 - ne pas plier ou casser,
 - ne pas désadapter à la main,
 - si usage unique : jeter immédiatement après usage dans un conteneur pour objets perforants adapté, situé au plus près du soin, sans dépôt intermédiaire, y compris lors de l'utilisation de matériel sécurisé,
 - si réutilisable : manipuler le matériel avec précaution et procéder rapidement à son nettoyage et sa désinfection.



R24 Pour les soins exposant à un risque de projection/aérosolisation, porter des équipements de protection individuelle de manière adaptée (protection du visage, de la tenue, port de gants si peau lésée).



R25 Mettre en œuvre des procédures et des techniques limitant les risques d'accident avec exposition au sang ou à tout produit biologique d'origine humaine dans les secteurs où sont pratiqués des actes/gestes à risque élevé (bloc opératoire, odontologie, laboratoire...).



R26 La conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang doit être formalisée, actualisée et accessible à tous les intervenants dans les lieux de soins.



PRÉCAUTIONS STANDARD 2017

Gestion des excréta



R27 Porter des équipements de protection individuelle de manière adaptée (port de gants de soins, protection de la tenue) et respecter l'hygiène des mains lors de la gestion des excréta (urines, selles, vomissures).

R28 Éviter les procédures manuelles de vidange et d'entretien des contenants et proscrire leur rinçage (ni douche, ni douchette) en raison du risque d'aérosolisation.



PRÉCAUTIONS STANDARD 2017

Gestion de l'environnement



R29 Manipuler avec des équipements de protection individuelle adaptés tout matériel (dispositif médical, linge, déchet...) visiblement souillé ou potentiellement contaminé par du sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine.

R30 Matériel ou dispositif médical réutilisable :
 - avant utilisation, vérifier que le matériel a subi une procédure d'entretien appropriée au niveau requis (non critique, semi-critique, critique),
 - après utilisation, nettoyer et/ou désinfecter le matériel avec une procédure appropriée.



R31 Procéder au nettoyage et/ou à la désinfection de l'environnement proche du patient (table de chevet, adaptable, lit...) des surfaces fréquemment utilisées (poignées de porte, sanitaires...) ainsi que des locaux (sois, surfaces) selon des procédures et fréquences adaptées.

R32 Linge sale et déchets : évacuer au plus près du soin dans un sac fermé et selon la filière adaptée.



INFORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ESMS

Tableau Récapitulatif

INFECTION ET/OU AGENT INFECTIEUX	PC Contact	PC Gouttelettes	PC Air
Abcès			
BMR responsable d'une infection : - Gastro-intestinale - De la peau, d'une plaie ou d'une brûlure - Urinaire - Respiratoire			
<i>Clostridium difficile</i>			
Conjonctivite et infection respiratoire à Adénovirus			
Coqueluche			
Gale			
Gastro-entérite (diarrhée)			
Grippe - Myxovirus influenzae			
Hépatite A, E			
Herpès			
Méningite bactérienne (ex. à méningocoque)			
Oreillons			
Pneumonie à méningocoque (<i>Streptococcus pneumoniae</i>) et à streptocoque du groupe A chez les enfants			
Pneumonie à <i>Mycoplasma pneumoniae</i>			
Rotavirus			
Rougeole			
Rubéole			
Salmonellose (dite mineure)			
Scarlatine			
Staphylococcies : De la peau, d'une plaie ou d'une brûlure Furonculose forme majeure seulement			
Streptococcies : De la peau, d'une plaie ou d'une brûlure érysipèle			
Tuberculose pulmonaire active			
Varicelle			
Virus de l'hépatite B, C ou à virus HIV	Respect Strict des Précautions STANDARD		
Virus respiratoire syncytial (VRS)			
Zona			