

# Brossage appareil dentaire

version 1 - 2024

logigramme 2/2

En savoir plus : [www.cpias-grand-est.fr](http://www.cpias-grand-est.fr)

Qui ?	Quoi ?	Comment ?
<p>Patients dépendants, résidents dépendants</p>	<pre> graph TD     A["Brosse à prothèse dentaire + savon doux"] --&gt; B["Boite à prothèse dentaire + fixatif si besoin"]     C["A défaut, brosse à dents différente de celle pour les dents + savon doux"] --&gt; B     B --&gt; D["Solution hydro-alcoolique + gants de soins à usage unique + tablier plastique à usage unique + sac poubelle"]     D --&gt; E["Faire le soin au dessus d'un lavabo rempli d'eau ou d'une cuvette remplie d'eau (évite la casse des prothèses)"]     E --&gt; F["Retirer l'appareil dentaire. Réaliser le brossage. Rincer l'appareil"]     F --&gt; G["Remettre l'appareil en bouche après avoir réalisé le soin de bouche"]     F --&gt; H["Si mise en boîte, sécher et conserver au sec l'appareil dentaire"]     G --&gt; I["Retirer gants et tablier. Faire une friction hydro-alcoolique"]     H --&gt; I                     </pre>	<p>Minimum <b>1 fois</b> par jour, idéalement <b>2 fois</b> (matin et soir)</p> <p>Faire une friction hydro-alcoolique puis mettre les gants et tablier</p> <p><b>Techniques :</b> <b>voir</b> <b>vidéothèque en annexe</b></p> <p>Si boîte sale, nettoyer au liquide vaisselle ou au savon doux</p> <p>Si trop usée changer la boîte</p>

<p><b>Réévaluation</b></p>	<p><b>Réévaluer l'état bucco-dentaire à chaque brossage</b> Si lésions, abcès, saignements, inconfort, problème d'adaptation de la prothèse = prévoir une consultation dentaire</p>
----------------------------	---

- Transmissions écrites et observations dans le dossier du patient/résident

• membres groupes de travail : Carole Etiennot, Cadre supérieur de santé, pôle odontologie CHU Reims; Dr Robert Mlinarevic, Odontologiste, chirurgie orale, CHU Reims; Sophie Thierry, IMH Diaconnat Mulhouse; Maryse Colson, IMH UNEOS; Carole Dumas, IBODE PCI, CPIas GE; Marina Pereira-Colot, IDE PCI, CPIas GE.

• relecture : CPIas Grand Est; Séverine Noir-Mansuy, PH Hygiéniste, EOH CHU Reims.

## Annexe : la vidéothèque



Insertion/  
Désinsertion des  
prothèses



Désinsertion  
prothèse amovible  
avec crochets



Désinsertion  
prothèse maxillaire



Désinsertion  
prothèse  
mandibulaire



Mise en place de  
fixatif prothèse



Hygiène des  
prothèses

- membres groupes de travail : Carole Etiennot, Cadre supérieur de santé, pôle odontologie CHU Reims; Dr Robert Mlinarevic, Odontologiste, chirurgie orale, CHU Reims; Sophie Thierry, IMH Diaconnat Mulhouse; Maryse Colson, IMH UNEOS; Carole Dumas, IBODE PCI, CPias GE; Marina Pereira-Colot, IDE PCI, CPias GE.
- relecture : CPias Grand Est; Séverine Noir-Mansuy, PH Hygiéniste, EOH CHU Reims.