

| Infection (liste non exhaustive) | Type de précautions | Équipements de Protection Individuels (EPI) | | | | Visiteurs | Hygiène Des Mains (HDM) | Activités | Linge | Déchets | excreta | Vaisselle | Bionettoyage | |
|--|--|---|--|---|---------------------------|--|---------------------------------|--|--|---|--|-----------|--|--|
| | | Gants | Masques | Tablier ou Surblouse | Lunettes | | | | | | | | | |
| BMR, BHRé (hors Infection respiratoire), Infection cutanée (plaies, érysipèle) | CONTACT Chambre seule avec sanitaire | Précautions Standard (PS) (liquides biologiques, muqueuses, lésions) | PS (si signes cliniques respiratoires) | Tablier, pour tout soin en contact avec résident/ personnes accueillies ou environnement proche | PS | HDM Ne pas s'asseoir sur le lit Ne pas déposer d'effets personnels sur le lit Ne pas utiliser les toilettes du résident | Friction Hydro-Alcoolique (FHA) | | Standard | Déchets en lien avec le foyer infectieux, DASRI Autres déchets, DAOM | Standard | | Standard | |
| Gastro-Entérite Aiguë (GEA) | Traçabilité dans dossier du résident/ personnes accueillies Information du résident/ personnes accueillies, usager, bénévoles | PS | Si vomissements masque chirurgical Type IIR | Idem (BMR/BHRé) | Si vomissements | | FHA | Maintient en chambre le plus possible (repas) | Filière contaminée | DASRI | Lave-bassin ou sac à bassin puis dD norovirucide | | Détergent/ désinfectant (dD) norovirucide | |
| <i>Clostridium difficile</i> | Si transfert, feuille de transmission | Dès l'entrée en chambre | PS | Surblouse dès entrée en chambre | PS | Idem (BMR, BHRé) + gants et surblouse | Savon doux puis FHA | | Filière contaminée | | Sac à bassin puis lave-bassin ou dD sporicide | | Standard (lave-vaisselle à 60°C de préférence) | dD sporicide |
| Gale, poux, puces | Si transfert, feuille de transmission | Dès l'entrée en chambre | PS | Surblouse dès entrée en chambre | PS | | Savon doux puis FHA | | Filière contaminée (lavage >60°C, ou 8 jrs fermés) | | | Standard | | Standard + Traitement des tissus produit acaricide |
| Infections Respiratoire Aiguë (IRA), Coqueluche, grippe, COVID, Méningite | GOUTTELETTES Chambre seule + idem contact | PS | Masque chirurgical Type IIR (FFP2, si soins avec aérosols) | Surblouse si soins à risque d'aérosols | Soins à risque d'aérosols | Idem (BMR, BHRé) + masque chirurgical | FHA | | Standard | Idem Contact BMR/BHRé | Standard | | Standard | |
| Tuberculose, Varicelle*, Zona*, Rougeole** *Éviter tout contact avec les sujets immunodéprimés et les femmes enceintes non immunisées ** Éviter tout contact avec sujets immunodéprimés, femmes enceintes, enfant < 1 an | AIR Chambre seule, porte fermée + idem contact | PS | Masque type FFP2 | Surblouse si soins à risque d'aérosols | Soins à risque d'aérosols | Idem (BMR, BHRé) + masque FFP2 | FHA | A éviter, si sortie port de masque chirurgical | Standard | Idem Contact BMR/BHRé | Standard | | Standard | |