



FICHE ÉTUDE SPARES

PREVENTION DE LA TRANSMISSION CROISEE DES BHRé



Nom de l'établissement :

1. Y avait-il une épidémie de BHRé en cours dans l'établissement au mois de septembre 2020 ? (On entend par épidémie la découverte d'un cas de portage de BHRé associé à au moins un cas secondaire) oui non

2. Quelle est la stratégie de prise en charge des patients porteurs d'entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu (EBLSE) ? (Le portage de EBLSE est défini comme l'isolement d'une EBLSE sur un prélèvement clinique ou de dépistage)

- Application systématique des précautions complémentaires contact en plus des précautions standard
- Application des précautions complémentaires contact en plus des précautions standard uniquement pour les EBLSE hors *Escherichia coli*
- Application des précautions standard uniquement
- Pas de stratégie définie
- Autre stratégie
- Non applicable

3. Existe-t-il des dépistages systématiques de EBLSE/BHRé dans votre établissement ? (Dépistage systématique de EBLSE/BHRé : stratégie de dépistage uniformément appliquée aux patients en fonction d'une situation clinique ou dans une unité/service, en dehors d'une situation épidémique) oui non

4. Si oui, pouvez-vous préciser quels dépistages sont réalisés dans les situations suivantes :

- Lors des rapatriements sanitaires EPC ERG EBLSE
- Pour les patients ayant été hospitalisés au moins 24h dans l'année précédente à l'étranger EPC ERG EBLSE
- Pour les patients ayant séjournés à l'étranger depuis moins de 3 mois EPC ERG EBLSE
- Dans le service de réanimation EPC ERG EBLSE
- Dans des services hors réanimation EPC ERG EBLSE
- A l'admission de résidents en provenance d'un établissement médico-social dans lequel une épidémie est active EPC ERG EBLSE
- Réhospitalisation d'un patient aux antécédents de portage d'EPC ou d'ERG ou d'EBLSE EPC ERG EBLSE