



# CLOSTRIDIUM DIFFICILE

## MESURES À METTRE EN PLACE DÈS LA CONFIRMATION DE L'ÉPIDÈMIE

Date de remplissage de la check list : / /

Ets concerné :

Secteur(s) concerné(s) :

Signalement externe : **2 cas d'infections à Clostridium Difficile pouvant être reliés**

Réalisé le : / /



### Mesures

Fait   
(cocher)



### Commentaires

#### POUR LES PATIENTS / RESIDENTS SYMPTOMATIQUES (DES L'APPARITION DES PREMIERS CAS)

Mise en place des Précautions Complémentaires **Contacts Spécifiques**

Maintien en chambre seule avec prise des repas en chambre

Mise à disposition de **savon doux + essuie mains** avec rappel de la nécessité de renforcer l'hygiène des mains : **lavage au savon doux + FHA à la sortie de la chambre**

Mise à disposition à l'entrée de la chambre de **gants et surblouses à manches longues** à UU qui seront retirés avant la sortie de la chambre + port de tablier en plastique à UU lors des soins mouillants/ souillants

Mise à disposition des produits nécessaires : **renforcement du bio nettoyage quotidien en 3 temps** sur l'ensemble du secteur concerné : détergence /rinçage/ désinfection eau de Javel 0.5% (contact 10 minutes) ou utilisation de détergent désinfectant sporicide à base d'acide Péricacétique

Mise à disposition de matériel de soins à UU ou individualisé

#### AU NIVEAU DU (DES) SECTEUR(S) CONCERNÉ(S)

Regroupement géographique des patients symptomatiques ou « Fermeture » du secteur : maintien des patients / résidents (symptomatique ou non) en secteur (autant que possible repas en chambre et limitation des activités)

Pas d'accès aux plateaux techniques (sauf urgences) et aux activités collectives

Bio nettoyage « spécifique C. difficile » sur l'ensemble du secteur

TraITEMENT du linge souillé de selles selon filière spécifique (cf. fiche technique)

#### RECHERCHE ETIOLOGIQUE / TRAITEMENT

En cas d'apparition de diarrhées : recherche de la présence de toxines dans les selles et coprocultures (avec recherche de C. difficile) pour antibiogramme

Envoi des souches au CNR en cas d'épidémie ou en cas de signes de gravité

TraITEMENT de l'ensemble des patients présentant des signes cliniques

#### GESTION DES EXCRETA

Sanitaires privés ou utilisation de chaise percée

Vérification de l'élimination des excréta directement en lave bassin, ou utilisation de système de protection de bassins

Mise en place de l'élimination des protections anatomiques en filière DASRI

#### INFORMATION

Information des patients / résidents / des visiteurs (affichage/ signalisation....)

Information de la Direction

Information / formation de tous professionnels, intervenants... notamment ceux en charge du bionettoyage

Information des services d'aval si transfert de patient symptomatique ou de patient/résident en provenance de l'unité en situation épidémique

Contacter l'EOH ou l'EMH (si la structure en dispose) pour appui et conseils

#### SURVEILLANCE

Surveillance active de l'apparition de nouveaux cas chez les patients / résidents et le personnel

Mise en place du recensement des cas et suivi (courbe épidémique)

\*Se référer à la fiche technique « Prévention de la transmission des Infections à Clostridium Difficile »