

Soin de bouche

version 1 - 2024

logigramme 1/2

En savoir plus : www.cpias-grand-est.fr

Qui ?	Quoi ?	Comment ?
<p>Patients dépendants, résidents dépendants</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Patient/résident coopérant</p> <p>↓</p> <p>Brosse à dents à poils souples manuelle ou électrique + dentifrice</p> <p>↓</p> <p>Solution hydro-alcoolique + gants de soins à usage unique + tablier plastique à usage unique + sac poubelle</p> <p>↓</p> <p>Brossage des dents du rose vers le blanc</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Patient/résident non coopérant</p> <p>↓</p> <p>Abaisse langue ou pince + compresses non stériles imbibées</p> <p>↓</p> <p>Eau ou Chlorhexidine sur prescription médicale uniquement</p> <p>↓</p> <p>Soin avec compresses imbibées</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Rincer la bouche et essuyer les lèvres</p> <p style="text-align: center;">Retirer gants et tablier. Faire une friction hydro-alcoolique</p>	<p>Minimum 1 fois par jour, idéalement 2 fois (matin et soir)</p> <p>2 minutes</p> <p>La Chlorhexidine est un médicament dont l'utilisation est à durée limitée</p> <p>Faire une friction hydro-alcoolique puis mettre les gants et tablier</p>



Faire attention troubles de la déglutition ou réflexes nauséux
L'action mécanique est la plus importante

<p>Réévaluation</p>	<p>Réévaluer l'état bucco- dentaire à chaque brossage Si lésions, abcès, saignements, inconfort, douleur = prévoir une consultation dentaire</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Si saignement, ne pas arrêter le brossage, le saignement est un indicateur de l'inflammation</i> • Transmissions écrites et observations dans le dossier du patient/résident 	